

NÁVOD K POUŽITÍ – VarroMed® 555 ml

Veterinární přípravek proti varroáze včel

1 K ČEMU SLOUŽÍ



VarroMed® je registrovaný veterinární léčivý přípravek určený k léčbě varroázy způsobené roztočem *Varroa destructor* u včel medonosných. Je vhodný pro včelstva s plodem i bez plodu. Obsahuje kyselinu šťavelovou a kyselinu mravenčí.



2 PŘED POUŽITÍM



25–35 °C

- Přípravek před aplikací zahřejte na 25–35 °C.
- Láhev dobře protřepejte.
- Aplikujte nejlépe při nižší letové aktivitě včel, ideálně večer.
- Doporučuje se odstranit voskové můstky mezi horními loučkami rámků.




3 DÁVKOVÁNÍ

Velikost včelstva	Dávka
5 000–7 000 včel	15 ml
7 000–12 000 včel	15–30 ml
12 000–30 000 včel	30–45 ml
více než 30 000 včel	45 ml

Dávku vždy přizpůsobte skutečné velikosti včelstva.

4 ZPŮSOB APLIKACE

- 1 Otevřete úl.
- 2 Přípravek pomalu a rovnoměrně nakapejte přímo na včely v obsazených uličkách plodiště.
- 3 Celkovou dávku rozdělte mezi obsazené uličky.
- 4 Během aplikace nezvedejte rámků.
- 5 Rámky nezvedejte ani přibližně 1 týden po posledním ošetření.



NÁVOD K POUŽITÍ – VarroMed® 555 ml

Veterinární přípravek proti varroáze včel

5 FREKVENCE OŠETŘENÍ



JARO

- Ošetření se provádí při rostoucí populaci včelstva, pokud přirozený spád překročí 1 kleštík za den.
- Pokud během 6 dnů po prvním ošetření spadne více než 10 kleštíků, lze ošetření ještě dvakrát opakovat v intervalu 6 dnů.
- Maximálně 3 aplikace.



PODZIM

- Ošetření zahajte na konci léta nebo začátkem podzimu při klesající populaci včelstva, pokud přirozený spád překročí 4 kleštíky za den.
- Základní ošetření se provádí 3× v intervalu 6 dnů.
- Pokud během 6 dnů po třetím ošetření spadne více než 150 kleštíků u starších včelstev nebo 90 kleštíků u nových včelstev v prvním roce, lze provést další dvě aplikace.
- Maximálně 5 aplikací.



ZIMA – BEZPLODÉ OBDOBÍ

- Na začátku bezplodého období se provede jedno ošetření.

6 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



- Nepoužívejte v období produkce nektaru.



- Nepoužívejte, pokud jsou na úlu nasazeny medníky.



- Všechna včelstva na jednom stanovišti je vhodné ošetřit současně.



- Zajistěte včelám dostatečný přístup k pitné vodě.



- Nekombinujte současně s jinými akaricidními přípravky.



- Sledujte přirozený spád kleštíka před ošetřením a až 6 dnů po každé aplikaci.



- Přípravek je určen pro úly se svislými rámkami přístupnými shora.

7 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI



Přípravek může dráždit pokožku a oči.

- Při aplikaci používejte ochranné rukavice odolné vůči kyselinám, ochranné brýle a vhodný ochranný oděv.
- Při zasažení pokožky místo ihned opláchněte vodou.
- Při zasažení očí je vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu 10 minut.
- Při práci nejzte, nepijte ani nekuřte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

8 UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANNÁ LHŮTA



Uchovávání

- Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
- Láhev udržujte dobře uzavřenou.
- Uchovávejte v původní krabičce, chráněné před světlem.
- Po prvním otevření spotřebujte do 30 dnů.



Ochranná lhůta

Med: 0 dní.

Přípravek však nesmí být aplikován v období produkce nektaru ani při nasazených mednících.



Tento návod je orientační. Před použitím si vždy přečtěte originální příbalovou informaci dodanou s přípravkem.